

क्या आप गोली खाके अबॉर्शन / गर्भपात करने जा रहे हैं ?

आपकी मदद के लिए कुछ जानकारी

भरोसा
रखिये




ये तरीका
सुरक्षित है




आप चाहो तो
आगे जाके माँ बन
सकते हो




ये आपका
हक है




याद
रखिएगा



आखरी महावारी
होने के 12 हफ्तों के
अंदर लेनी है गोली




अगर आपको
एनीमिया/ खून
की कमी न हो



IUD है तो
निकालिएगा जरूर

और जानकारी के लिए
स्वाइप कीजिये

गोली लेने का तरीका



पहले दिन- एक गोली

नाम: **मीफेप्रिस्टोन**


शकल- मोटी और गोल

कैसे खाएं?

पानी से निगल के
कर दीजिये गोल



फिर क्या होगा ?

थोड़ा सा खून गिर सकता है 

थोड़ा सा दर्द, पेट कस सकता है

पर कई लोगों को कुछ भी नहीं लगता

दर्द हो तो दर्द की गोली लो

आइबुप्रोफेन



अब क्या करना है ?

अगले 24 घंटों के बाद और 48 घंटों से पहले-
खाईए **4 गोलियां**, चार सहेलियों जैसी खड़ी हुई,
एक सी सब, नाम **मीसोप्रोस्टल**


कैसे ? **चारों** को
एक साथ रखिए

जीभ
के नीचे



या गाल
के अंदर

(निगलना नहीं है)



30 मिनट तक रखिए, ताकि धीरे धीरे हो जाये घोल।
अपनी पसंद के सिरियल का एपिसोड देखिये। या इंतज़ार करते
हुए किसी उपन्यास के 15 पन्ने पढ़ डालिए। 30 मिनट के बाद,
गोली के कोई टुकड़े अगर बचे हैं, तो निगल लीजिये।

फिर क्या होगा ?

इन चीजों का होना नॉर्मल है -

2 दिनों तक खून का थोड़ा भारी गिरना, खून के थक्के

महावारी की तुलना में बहाव ज़्यादा होगा, तो खूब सारे पैडज़ साथ में तैयार रखिए।

2 हफ्तों तक खून का हल्का बहाव और थोड़े बहुत खून के दाग बन सकते हैं।



दर्द = महावारी के दर्द से ज़्यादा (दर्द की गोली ले सकते हैं)



बुखार = हल्का सा



जी का मचलना, उल्टी आना - नींबू खाइये, या उल्टी की दवा लीजिये

अगर खून न गिरे, दर्द न हो तो ?

अगर 12 घंटों के अंदर
ना खून गिरे न पेट कसे



तो ये चार बहनें, यानी
मीसोप्रोस्टल की गोलियां फिर से
लीजिये (वो अकेली वाली गोली यानी
मीफेप्रिसटोन नहीं, बल्कि जो साथ
की चार गोलियां हैं, उन्हें लीजिये!)



अगर खून नहीं बह रहा, फिर भी दर्द हो रहा
है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिये!

कैसे जानें कि गर्भ खाली हो गया है ?



1 कुछ दिनों में तबियत ठीक लगेगी, प्रेग्नेंट नहीं महसूस होगा और फिर नॉर्मल महावारी का इंतज़ार कीजिये



2 थोड़ा टेंशन हो रहा है तो तसल्ली के लिए कुछ दिनों बाद पालीक्लिनिक में **ब्लड टेस्ट**  करा लीजिये या 2-3 हफ्तों के बाद घर पर पेशाब से **प्रेगनेंसी टेस्ट**  कर लीजिये। आप अल्ट्रा साउंड भी करा सकते हैं।




क्या मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ?

3 मन में बहुत आशंका हो- तो डॉक्टर के पास चेक करवा लीजिये और चैन की सांस लीजिये



चिंता कब करनी चाहिए ?

1 दर्द या पेट का कसना हो रहा है, पर खून न गिरे



2 खून गिरे ज़ोरदार और चक्कर या बेहोशी आये



3 खून का रंग जो हरा पीला हो, या खून है बदबूदार



4 अगर तेज़ रहे बुखार और दवाई से भी कम ना हो



5 3 दिनों के बाद भी, खून के थक्के बंद हुए, पर दर्द हो लगातार



10-12 दिनों के बाद भी हो आपका बुरा हाल

डॉक्टर के पास जाइए या ASHA के पास !

डॉक्टर से मिलने में हो रही झिझक?

बताना ज़रूरी नहीं कि अबॉर्शन
किया है, बस यही कहिए -

मिसकैरेज/ बच्चा
गिरने का डर है



चाहो तो अकेले मत जाना। **किसी को साथ
लेके जाना।** हेल्थ वर्कर या सहेली या पार्टनर।

इन चीजों का रखिए ध्यान-

कोई हाथ
बंटा दे घर
के काम

अगर निराशा
हो थोड़ी,
तो सहेली ले
हाथ थाम



मन भारी हो तो
हो सहारे को सहेली
कुछ समय निकाल
के करें आराम

याद रखिए! तरीका है सरल पर मन में हो सकती है उथल पुथल

खून बहने पर दर्द होने के लिए **करें तैयारी** काफी सारे पैड रखें, दर्द की गोलियां, और शुरू करने से पहले लें थोड़ा शांत टाइम



आप अकेले नहीं हैं,
आप गलत नहीं कर रहे—
बहुत सारे लोग अबॉर्शन
कराते हैं! आप भी ऐसे
किसी भले प्यारे इंसान
को जानते होंगे

ध्यान रखें

कि बाद में इन्फेक्शन
न हो, एक हफ्ते तक
योनी के अंदर
कुछ न डालें



अगर आपका प्यारा कोई
अबॉर्शन कराना चाहे
तो उनको **सपोर्ट** करो
और खुद ऐसे लोगों का
सपोर्ट लें जो आपसे
प्यार करते हैं

सुरक्षित रहिए, सेहतमंद और खुश रहिए!